

制酸、潰瘍治療劑
"中美" **潰胃爽**[®]
KWEI SAN Tablets "C.M."

衛署藥製字第023313號

本劑中含有對胃腸神經緩和作用及抗痙攣作用之 Scopolamine-N-Butylbromide 與 Dicyclomine HCl, 精神安定劑 Chlordiazepoxide HCl, 及制酸作用的 Magnesium Oxide, Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel, Synthetic Aluminum Silicate, 又有可促進潰瘍面肉芽新生作用的 Sodium Copper Chlorophylline 等七種有效成分, 經合理的配合, 由各成分之相乘協力作用而更發揮對胃、十二指腸潰瘍、胃炎等有效治療效果。

【成分】 Each Tablet contains :

Scopolamine-N-Butylbromide.....	2mg
Dicyclomine Hydrochloride.....	2mg
Chlordiazepoxide Hydrochloride.....	5mg
Sodium Copper Chlorophylline	3mg
Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel.....	350mg
Magnesium Oxide	40mg
Synthetic Aluminum Silicate	60mg
Corn Starch - Carboxymethylcellulose Calcium - Sodium Lauryl Sulfate - Carboxymethylcellulose Sodium - Magnesium Stearate	

【適應症】胃、十二指腸潰瘍、胃痛、胃酸過多症、胃痙攣、急慢性胃炎。

【用法用量】通常成人每次1~2錠, 1日服用3~4次, 依年齡症狀適宜增減。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

一、禁忌：

- (a)青光眼病患。
- (b)攝護腺腫大引起排尿困難之病患。
- (c)嚴重心臟病病患。
- (d)麻痺性腸阻塞之病患。

二、孕婦、授乳婦請勿用為宜。

三、心、肝、胃、腦實質障礙患者應注意使用。

四、相互作用：

- (a)本品若與三環素抗鬱劑 phenothiazine 系藥劑, MAO 阻礙劑, 抗組織胺劑併用或飲酒, 會增強其作用。
- (b)本品會抑制四環素類抗生素之吸收, 故宜避免與此類抗生素併服。

五、副作用：

- (a)偶有口渴、便秘、鼓腸、心悸亢進、發疹等過敏症狀
- (b)偶有睡意、頭暈、目眩、眼調節障害、步行失調。
- (c)某些精神障礙患者, 有時引起刺激興奮、錯亂等異常反應; 大量連用後急速停藥、間有譫妄, 偶有痙攣等現象。

六、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症, 應謹慎小心使用。

【包裝】6-1000錠瓶, 盒裝。



PIC/S GMP 藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線: 04-7524166

http://www.chungmei.com.tw