

肌鬆弛劑 爽筋片 Santin Tablets

衛署藥製字第01041號

【成分】 每片含

Chlormethazanone.....100mg
Lactose、Starch Corn、Pregelatinized Starch、Magnesium Stearate、
Sodium Starch Glycolate、Food Blue No.1 Alu Lake、PVP K-30

【作用、特點】

本劑對多鍵神經(Polysynaptic Reflexes)之過度或不正常之反射能發揮適度之選擇性阻斷作用。面對於單鍵神經反射(Monosynaptic Reflex)即無任何影響，對以可發揮其鬆弛肌肉及鎮靜情緒之相乘作用，能消除肌肉痙攣、疼痛。

- 1.鬆弛筋肌過度緊張、促使腰痛、肩酸等肌肉疼痛、解除或改善。
- 2.不妨礙正常肌肉機能及意識，本劑具有解除肌肉緊張之作用能保持肌肉運動機能，促其恢復運動活力、因其對於單鍵神經反射及末梢感覺神經系無任何影響，對於思考及意識亦無妨礙。
- 3.適度之鎮靜作用，本劑可解除心臟神經症，同與本劑之鬆弛肌肉緊張作用相乘奏效。
- 4.藥效作用、迅速持久、本劑內服後15~30分鐘、即顯現療效、並可持續六小時以上。
- 5.副作用極微：對鼠類之急性毒性、其LD₅₀為1380mg/kg人類服用量僅其百分之一，雖經長期服用、對於內臟血液、尿等俱無不良影響、亦無積蓄作用及習慣性至於發疹、噁心等副作用。

【適應症】

腰痛、肩酸痛、震顫性癱瘓等症之肌肉痙攣僵硬。


【用法用量】

通常成人每次1~2片，一日3~4次，視年齡症狀適宜增減之。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.極少數引起多形性紅斑(Erythema multiforme)、Stevens-Johnson症侯群和毒性皮膚壞死(Toxic epidermal necrolysis)案例被報導。
- 2.稀有之倦睡、發疹、口渴等現象發生時，一經減量或停藥即可消失。

【包裝】 4~1000片瓶裝。

PIC/S GMP藥廠
 中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166
健康訊息請參閱網站 <http://www.健康之道.tw>