

抗過敏性藥劑

# 敏拿好爾<sup>®</sup> 糖衣錠

BENNAHOLU S.C. Tablets

衛署藥製字第030508號

敏拿好爾糖衣錠以具有比 Glucuronic Acid 之解毒作用強，並有抗過敏性作用及刺激副腎皮質素作用之 Glycyrrhizin 為主劑，配合 Orotic Acid 及抗組織胺劑，Chlorpheniramine Maleate，尤於三者之弱及因此引起的疾病有良好的治療效果。

【成分】 Each Tablet contains:

Glycyrrhizin.....	50mg
Orotic Acid.....	30mg
Chlorpheniramine Maleate.....	5mg

【作用】

Glycyrrhizin

1. 解毒作用：在人體內生成 Glucuronic Acid 及 Glycyretin Acid，故比單獨的 Glucuronic Acid 有更大的抱合解毒作用。
2. 抗過敏性作用：有預防及治療蕁麻疹及濕疹的效能。
3. 護肝作用：有減輕肝臟及保護肝臟之作用。

Orotic Acid

1. 糖質代謝作用：Orotic Acid 能促進體內肝醣 (Glycogen) 之合成，及促進乳腺生成乳糖。
2. 脂肪代謝作用：Orotic Acid 對血液中膽醇 (Cholesterol) 之正常化及除去肝臟中之脂肪有重大作用。
3. 蛋白質代謝作用：Orotic Acid 因能促進攝取於體中蛋白質，氨基酸之利用，所以有成長促進因子之作用。
4. 解毒作用：Orotic Acid 在體內生成 Uridine-2-Phosphoric Acid, Glucuronic Acid 比單獨的 Glucuronic Acid 有更強的抱合解毒作用。

Chlorpheniramine Maleate

為抗組織胺劑中副作用少，抗過敏作用強的藥物，對過敏性疾患有著效。

【適應症】蕁麻疹、濕疹、皮膚炎、癢疹、藥物過敏、食物過敏，過敏性疾患。

【用法用量】

通常成人1次1錠，1日服用2~3次，兒童依年齡遞減，醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、一般注意：(1)可能產生嗜眠現象，應避免駕車及危險機械的操作。  
(2)對孕婦的安全性尚未確立，孕婦使用需小心。  
(3)攝取酒精類及中樞神經抑制劑併用時請謹慎使用。
- 二、副作用：(1)過敏症：偶有發疹、皮膚乾燥等現象。  
(2)精神神經方面：可能產生神經過敏、興奮不眠、視覺模糊等精神障礙。  
(3)胃腸：偶而出現口渴食慾不振、心窩不快感。  
(4)血液：極少病例有血小板減少，無顆粒細胞症，再生不良性貧血等現象。
- 三、禁忌：(1)綠內障患者。  
(2)前列腺肥大等下部尿部閉塞性患者。

【包裝】6~1000錠盒裝、瓶裝。



中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166

健康訊息請參閱網站 <http://www.健康之道.tw>